

DULKO 480 SC®

RSCO-INAC-0101A-X0382-064-38.70

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Categoría Toxicológica 4 PRECAUCIÓN (banda azul)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612

www.lapisa.com

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO: 38.70%

Fipronil

INGREDIENTES INERTES: 61.30%

Humectante, dispersantes, estabilizador, antiespumante, anticongelante, amortiguador, espesante, conservador, secuestrante y diluyente.

Total 100%

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo, tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale (90)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga ravida</i>)	300 - 500 mL/ha Realizar una aplicación al momento de la siembra, bañando la semilla por completo. Volumen de aplicación 288 - 388 L de agua/ha.
Papa (45)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga obsoleta</i>)	300 - 500 mL/ha Realizar una aplicación al momento de la siembra. Volumen de aplicación 379 - 479 L de agua/ha.
Caña de azúcar (30)	Barrenador (<i>Diatraea saccharalis</i>)	300 - 500 mL/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 14 días, cuando se detecten los primeros daños causados por la plaga. Volumen de aplicación 291 - 391 L de agua/ha.
Agave (SL)	Picudo del Agave (<i>Scyphophorus acupunctatus</i>)	75 - 125 mL/ha Realizar dos aplicaciones en drench a la planta (escurrimiento a la planta) a intervalo de 7 días, cuando se detecten los adultos en actividad. Volumen de aplicación sugerido 120 mL de mezcla/planta.
Avena Cebada Maíz Sorgo Trigo (90)	Gallina ciega (<i>Cyclocephala sp.</i> y <i>Phyllophaga sp.</i>)	300 - 500 mL/ha Realizar una aplicación en drench al cultivo, iniciar al momento de detectar los primeros adultos en actividad. Volumen de aplicación sugerido 120 mL de mezcla/planta.
	Chapulín diferencial (<i>Melanoplus differentialis</i>)	20 - 80 mL/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecte la presencia de la plaga. Volumen de aplicación 300 - 400 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL) Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: no entre al área tratada antes de las 12 hrs.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado y agite bien el producto. Con el equipo de protección señalado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO de esta etiqueta puesto, proceda a retirar el sello de seguridad con ayuda de unas tijeras y posteriormente gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con la ayuda de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación previamente llenado con agua, continuando su agitación. Use la dosis menor en infestaciones bajas y la dosis más alta en infestaciones mayores.

CONTRAINDICACIONES

No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en la etiqueta. No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales, o cualquier otro factor que interfiera en el crecimiento del cultivo. No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C o cuando haya posibilidades de lluvia. No usar como forraje restos de plantas tratadas con este producto.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con insecticidas a base de Imidacloprid en presentación suspensión concentrada; a base de Cyromazina en presentación polvo soluble y a base de Lambda Cyhalotrina en presentación concentrado emulsionable. Fungicidas a base de Azoxystrobin en presentación gránulos dispersables. Bactericidas a base de Sulfato de Gentamicina, Oxitetraciclina y Sulfato de Cobre en presentación polvo humectable.

También es compatible con fertilizantes foliares a base de macro y microelementos en presentaciones líquidas y de cristales solubles, así como, con reguladores de crecimiento a base de fitohormonas biológicamente activas en presentación líquida y ácidos húmicos en presentación líquida.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

GARANTÍA

LAPISA S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA S.A. DE C.V.

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.

www.lapisa.com

