

Lapitromicina®

Número de registro Q-2083-211

Solución inyectable.

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:	
Tulatromicina	100 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES:

Antibiótico macrólido.

Lapitromicina está indicado para **Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes:** en el tratamiento de

enfermedades respiratorias como complejo respiratorio bovino (CRB) asociada con *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma bovis*. Así como para el tratamiento de queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) causada por *Moraxella bovis*. Y en afecciones podales como pododermatitis interdigital (gabarro) causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Porphyromonas levii*.

Porcinos: para el tratamiento del complejo respiratorio de ganado porcino (CRP) asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica* y *Haemophilus parasuis*.

DOSIS:

Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de peso corporal). Dosis única. No administrar más de 7.5 mL por sitio de aplicación.

Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de peso corporal). Dosis única. No administrar más de 2.5 mL por sitio de aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes: Subcutánea en la tabla del cuello.

Porcinos: Intramuscular.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes: 22 días.

Porcinos: 5 días.

PRESENTACIONES:

Frasco de 100, 250 y 500 mL.

ADVERTENCIAS:

Producto para uso exclusivo en animales. No utilizar el producto en especies distintas a las mencionadas en la etiqueta. No administrar el producto en vacas productoras de leche para consumo humano.


Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a 25 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Una vez abierto, utilice el producto por no más de 30 días.

Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

Lea el prospecto/instructivo anexo antes de utilizar el producto.



FICHA TÉCNICA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ESPECIE:

