ZELK®
ACETAMIPRID 20 PS

Lapisa AGRÍCOLA
¡Cosechando resultados!

ZELK ®

RSCO-INAC-0101U-0508-003-20.0
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Polvo Soluble
Categoría Toxicológica 4 (Banda azul)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375.
La Piedad, Michoacán de Ocampo, México
Teléfonos: 352 526 1300 y 352 690 2001

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO:	
Acetamiprid	20%
Ingredientes inertes:	
Buffers, tensoactivo, emulsificante, colorante, diluyente	80%
Total	100%

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la semarnat.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

Este producto es moderadamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS.
INSTRUCCIONES DE USO.
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Vid (3)	**Trips del cogollo** *(Frankliniella occidentalis)*	200 - 400 g/ha Realizar tres aplicaciones vía foliar en intervalos de 7 días cuando aparezcan los primeros individuos. Aplicar en un volumen de 430 - 530 L de agua/ha, asegurando que haya una buena cobertura.
Chile Jitomate Berenjena (7)	**Mosquita blanca** *(Bemisia tabaci)*	150 - 350 g/ha Aplicación al follaje
	Mosquita blanca *(Bemisia argentifolii)*	200 - 350 g/ha Aplicación al follaje
	Piojillo de la papa *(Bactericera cockerelli)*	250 - 350 g/ha Aplicación al follaje
	Trips del cogollo *(Frankliniella occidentalis)*	150 - 300 g/ha Aplicación al follaje
	Pulgón myzus *(Myzus persicae)*	150 - 300 g/ha Aplicación al follaje
Papa (7)	**Mosquita blanca** *(Bemisia tabaci)*	150 - 450 g/ha Aplicación al follaje
	Mosquita blanca *(Bemisia argentifolii)*	200 - 350 g/ha Aplicación al follaje
	Piojillo de la papa *(Bactericera cockerelli)*	250 - 350 g/ha Aplicación al follaje
	Trips *(Frankliniella occidentalis)*	150 - 300 g/ha Aplicación al follaje
	Pulgón *(Myzus persicae)*	150 - 300 g/ha
Tomate de cáscara (7)	**Mosquita blanca** *(Bemisia tabaci)*	250 - 350 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 600 L/ha.
	Piojillo de la papa *(Bactericera cockerelli)*	
Cebolla Cebollín Poro Ajo (7)	**Trips** *(Frankliniella occidentalis)*	200 - 300 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 5 días entre cada una, al detectarse los primeros individuos. Volumen de aplicación 222 - 322 L de agua/ha.
Pepino Melón Sandía Calabacita (7)	**Mosquita blanca** *(Bemisia tabaci)* **Trips** *(Frankliniella occidentalis)*	200 - 300 g/ha Realizar 2 aplicaciones foliares al follaje a intervalo de 7 días entre cada una, al detectarse los primeros individuos. Volumen de aplicación 238-338 L de agua/ha.
	Trips negro *(Caliothrips phaseoli)*	200 - 300 g/ha Aplicación al follaje
Calabaza (SL)	**Mosquita blanca** *(Bemisia tabaci)* **Trips negro** *(Caliothrips phaseoli)*	200 - 300 g/ha Realizar 2 aplicaciones foliares al follaje a intervalo de 7 días entre cada una, al detectarse los primeros individuos. Volumen de aplicación 238-338 L de agua/ha.

ZELK®
ACETAMIPRID 20 PS

Lapisa AGRÍCOLA
¡Cosechando resultados!

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Chayote (7)	**Mosquita blanca** *(Bemisia tabaci)* **Trips** *(Frankliniella occidentalis)*	200 - 300 g/ha Realizar 2 aplicaciones foliares al follaje a intervalo de 7 días entre cada una, al detectarse los primeros individuos. Volumen de aplicación 238-338 L de agua/ha.
Espárrago (7)	**Trips** *(Frankliniella occidentalis)*	200 - 300 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 5 días entre cada una, al detectarse los primeros individuos. Volumen de aplicación 222 - 322 L de agua/ha.
	Pulgón *(Brachycorynella asparagi)*	250 - 350 g/ha Realizar dos aplicaciones vía foliar a intervalos de 7 días entre cada una, al detectarse los primeros individuos. Aplicar con volumen de agua de 380 - 480 L/ha.
Algodonero (45)	**Mosquita blanca** *(Bemisia argentifolii)*	250 - 500 g/ha Aplicación al follaje.
Brócoli Col Coliflor Col de Bruselas (7)	**Pulgón de la col** *(Brevicorine brassicae)* **Trips del cogollo** *(Frankliniella occidentalis)*	200 - 350 g/ha Aplicación al follaje.
Gerbera (SL)	**Mosquita blanca de los invernaderos** *(Trialeurodes vaporariorum)*	175 - 250 g/ha Aplicación al follaje.
Tabaco (SL)	**Pulgón** *(Myzus nicotianae)*	250 - 300 g/ha Aplicación al follaje.
Arándano Frambuesa Fresa Zarzamora (SL)	**Trips** *(Frankliniella occidentalis)*	240 - 320 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se presenten las primeras ninfas y/o adultos de la plaga, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta. Aplicar con volumen de agua de 551 - 651 L de agua/ha.
Aguacate (0)	**Trips** *(Scirtothrips perseae)* **Chicharrita** *(Empoasca spp.)* **Mosca Blanca** *(Paraleyrodes sp.)*	200 - 400 g/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de las plagas. Volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha.

()Intervalo de seguridad en días, entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:
no entre al área tratada antes de 12 hrs.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Abra cuidadosamente la bolsa utilizando su mascarilla. En un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto a la dosis recomendada en esta etiqueta y agitar, posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad del agua calculada en la calibración. Se recomienda mantener en agitación.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35º C.

FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados si es aplicado a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD
Este producto, no deberá mezclarse con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

GARANTÍA
LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA S.A. DE C.V.
Tel.: 352 526 13 00 / 352 690 2001
Carretera La Piedad-Guadalajara Km 5.5
Col. Camelinas, C.P. 59375
La Piedad, Michoacán, México.
info@lapisa.com