



Bovinos

Dectiver® -F

Endectocida y Fasciolicida de amplio espectro

(Solución inyectable de Ivermectina y Clorsulón)

REG. SAGARPA Q-2083-009

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

| | |
|-----------------|--------|
| Ivermectina | 10 mg |
| Clorsulón | 100 mg |
| Vehículo c.b.p. | 1 mL |

USO EN:

Bovinos y ovinos.

DESCRIPCIÓN:

DECTIVER® -F es una solución estéril inyectable de Ivermectina y Clorsulón lista para usarse. Está indicado en el tratamiento de los parásitos internos y incluyendo a la fasciola tanto en su etapa larvaria como adulta y como coadyuvante en el control de los parásitos externos de bovinos y ovinos por lo que ayuda a mejorar su eficiencia en la conversión alimenticia y ganancia de peso coadyuvando a tener un mayor peso a mercado. Se administra por vía subcutánea a nivel del cuello o por delante de la paleta.

INDICACIONES:

DECTIVER® -F es efectivo en el tratamiento y control de los estados adultos y larvarios de los parásitos internos hasta por 28 días según el parásito incluyendo la fasciola así como los parásitos externos en el ganado bovino .

DECTIVER® -F actúa en el control eficaz de los siguientes parásitos de los bovinos y ovinos:

Ostertagia ostertagi (incluye etapa hipobiótica)
Ostertagia spp
Bunostomun phlebotomun
Cooperia spp
Haemonchus spp
Oesophagostomum spp
Trichostrongylus spp
Nematodirus spp



Toxocara vitulorum
Mecistocirrus digitatus
Strongyloides papillosus
Chabertia ovina
Trichuris ovis
Dictyocaulus spp
Parafilaria bovicola
Thelazia spp
Protostrongylus rufescens

Fasciola:

Fasciola hepática
Fasciola gigántica

Controla los siguientes parásitos externos:

Larvas de mosca:

Hipoderma bovis
H. lineatum
Dermatobia hominis
Oestrus ovis
Chrysomyia bezziana

Acaros productores de sarna:

Psoroptes ovis var bovis
P. communis var ovis
Choriotes bovis



Bovinos

Contra piojos:

Haematopinus eurysternus

Solenopotes capillatus

Auxiliar en el control de:

Damalinia bovis

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

La única vía recomendada de administración de DECTIVER® -F es la vía subcutánea a nivel del cuello o por delante de la paleta en el ovino en la región axilar.

DECTIVER® -F puede ser administrado con una jeringa de tipo automática o convencional.

DOSIS:

Bovinos y ovinos: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo.

ADVERTENCIAS:

No se debe aplicar por vía intramuscular o intravenosa.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase en un lugar fresco y no se exponga a los rayos de sol.

No debe usarse éste producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 28 días después de la última aplicación.

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deberán de ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos

PRESENTACIONES:

Fascos de plástico de 500 mL.

USO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

