



# Porcinos

## Espectolin

Polvo Soluble

REG. SAGARPA Q-2083-054

### FORMULA:

Cada 100 g contienen:  
Espectinomicina 41.6 g  
Lincomicina 20.8 g  
Excipiente c.b.p. 100 g

### Descripción:

La combinación de espectinomicina y lincomicina tiene un efecto aditivo y en muchos casos sinérgico. La lincomicina actúa como un bacteriostático contra bacterias Gram positivas (*Staphylococcus spp*, *Clostridium tetani*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* *Clostridium perfringens*, y estreptococos betahemolíticos) y contra *Treponema hyodysenteriae*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma spp*. La espectinomicina es un antibiótico de amplio espectro con una acción bacteriostática o bactericida (dependiendo de la dosis) en contra de gérmenes Gram negativos y Mycoplasmas.

### INDICACIONES:

**Aves:** Para utilizarse en pollos de hasta 7 días de edad como auxiliar del control de:

Aerosaculitis causada por *Mycoplasma synoviae* o *Mycoplasma gallisepticum* susceptibles a la mezcla de espectinomicina y lincomicina.

Enfermedad Crónica Respiratoria Complicada (infección de los sacos aéreos) causada por *Escherichia coli* y *Mycoplasma gallisepticum* susceptibles a la mezcla de Espectinomicina y lincomicina.

**Cerdos:** Para la prevención y el tratamiento de la disentería porcina, de enteritis relacionadas a la *Escherichia coli*, neumonías micoplásmicas y bacterianas, erisipela y artritis infecciosa.



### DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

#### Pollo de engorda y pollita de reemplazo:

Disolver 100 g de Espectolin polvo soluble por cada 200 litros de agua de bebida. Administrar como única fuente de agua durante los primeros cinco a siete días de vida de los pollos.

#### Cerdos:

Disolver 100 g de Espectolin polvo soluble en 1,000 litros de agua de bebida. Administre como única fuente de agua cuando observe los primeros signos de la enfermedad. La duración del tratamiento debe ser de cinco a siete días.

### ADVERTENCIAS:

Diariamente deseche el agua medicada que no se haya utilizado y reemplace por agua fresca medicada.

No deberá usarse este producto cuatro días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

Manténgase en un lugar fresco y seco; y no se exponga a los rayos del sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIONES:

5 kg.

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

### SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA