



Porcinos

Fluvin®

Antiinflamatorio glucocorticoide

REG. SAGARPA Q-2083-105

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Flumetasona 0.5 mg

Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Cetosis bovina. Procesos inflamatorios asociados o no a quimioterápicos y antimicrobianos.

Afecciones musculoesqueléticas debidas a inflamaciones, cuando no existan cambios estructurales irreversibles. Estados alérgicos; tendosinovitis, bursitis, carpititis, miositis, artritis; eczema. Como coadyuvante en procesos infecciosos como traqueitis, bronquitis, sinusitis, neumonía y hepatitis; infecciones urogenitales como cistitis, nefritis, metritis.

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, perros y gatos

DOSIS:

Bovinos y equinos: De 2 a 10 mL.

Ovinos y caprinos: De 1 a 2 mL.

Porcinos: De 0.2 a 5 mL.

Perros y gatos: De 0.1 a 0.5 mL.

Las dosis propuestas pueden repetirse 12 ó 24 horas después, a juicio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, intravenosa, intraarticular o subcutánea.

ADVERTENCIAS:

No usar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



PRESENTACIONES:

50 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

