



Porcinos

LAPI-RESP FT®

Premezcla antibiótica

REG. SAGARPA Q-2083-161

FÓRMULA:

Cada kg contiene:

Tilosina tartrato	110 g
Florfenicol	40 g
Excipiente c.b.p.	1 kg



USO EN:

Aves y Cerdos.

INDICACIONES:

Premezcla antibiótica indicada para la prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias y digestivas cerdos de todas las edades y en aves de engorda, causadas por *Salmonella spp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Mycoplasma spp* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Especie	Tratamiento Preventivo	Tratamiento Terapéutico
Aves	Administrar 500 g de Lapi-Resp FT [□] por tonelada de alimento terminado, (20 ppm de florfenicol y 55 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.	Administrar 1 a 2 Kg de Lapi-Resp FT [□] por tonelada de alimento terminado, (40 a 80 ppm de florfenicol y 110 a 220 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.
Cerdos	Administrar 500 g de Lapi-Resp FT [□] por tonelada de alimento terminado, (20 ppm de florfenicol y 55 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.	Administrar 1 Kg de Lapi-Resp FT [□] por tonelada de alimento terminado, (40 ppm de florfenicol y 110 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento terminado.

ADVERTENCIAS:

No utilizar este producto en aves de postura.

No deberá usar este producto 7 días antes del sacrificio de aves y cerdos destinados para consumo humano.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

20 Kg.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

