



# Porcinos

## LAPIMICINA®

Oxitetraciclina Inyectable

REG. SAGARPA Q-2083-004

### FORMULA:

Cada mL contiene:

Oxitetraciclina base 50 mg  
(como clorhidrato de oxitetraciclina)

Vehículo c.b.p. 1 mL

### INDICACIONES, ESPECIES INDICADAS Y ORGANISMOS SUSCEPTIBLES:

Antibiótico de amplio espectro indicado en todas las especies para el tratamiento de problemas neumónicos, enteritis, leptospirosis, así como diversos procesos infecciosos septicémicos que sean causados por gérmenes susceptibles a la oxitetraciclina.

### ESPECTRO DE ACCIÓN:

*Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella bovis*, *Fusobacterium necrophorum*, *Escherichia coli*, *Actinobacillus lignieresii*, *Leptospira spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, etc.

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar a razón de 5 a 10 mg por kg de peso vivo por 4 días consecutivos.

Puede administrarse por cualquier vía según sea necesario.

### INCOMPATIBILIDAD:

Debido a que los fármacos bacteriostáticos interfieren con la acción bactericida de la penicilina, no administre oxitetraciclina concurrentemente con penicilina.

### PRECAUCIONES:

El uso del producto puede provocar irritación local transitoria que se manifiesta por inflamación y descoloramiento en el sitio de inyección. El dolor producido por la inyección puede minimizarse calentando la solución a temperatura corporal antes de la administración y evitando una mala técnica de inyectado. Después del tratamiento, los animales pueden presentar hemoglobinuria transitoria.



Si no se observa una mejora en los signos clínicos en 24-48 horas, consulte a su veterinario. No utilice el producto por más de 4 días consecutivos. El exceder los niveles de dosificación o la duración del tratamiento, provocará que los residuos tisulares no se eliminen en el periodo de suspensión.

No use en animales en crecimiento ni durante la gestación.

No administrar junto con diuréticos o calcio intravenoso.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### PERIODO DE RETIRO:

No deberá usarse este producto 30 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No utilizar para consumo humano la leche procedente de vacas tratadas hasta 72 horas después de la última aplicación.

### PRESENTACIONES:

Frascos con 100 y 500 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

