



Porcinos

NEUMO 200®

Premezcla de oxitetraciclina

REG. SAGARPA Q-2083-044

FORMULA:

Cada kg contiene
 Oxitetraciclina 200 g
 Excipiente c.b.p. 1000 g



INDICACIONES Y DOSIS:

Para la prevención y tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la acción de la oxitetraciclina. *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Clostridium spp*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Leptospira spp*, *Erysipelothrix rhusiopathie*, entre otros.

CERDOS

La premezcla actúa como promotor de crecimiento cuando se administra continuamente. También en la prevención de enfermedades respiratorias y como tratamiento de leptospirosis, mycoplasmosis y problemas respiratorios bacterianos.

Generalmente **Neumo 200®** es combinado de manera estratégica con otros antibióticos para ampliar el espectro de acción y la efectividad del tratamiento.

AVES.

Para la prevención de la enfermedad crónica respiratoria, sinovitis infecciosa, cólera aviar, mycoplasmosis.

Programa	Preventivo Kg/Ton	Gramos activos	Curativos Kg/Ton	Gramos activos
Pollo de Engorda	0.5 - 1.0 Kg (De 7 a 14 días)	100-200 g	1.5 – 2.5 Kg (De 10 a 15 días)	300 - 500 g
Aves de postura	0.5 - 1.0 Kg (De 7 a 14 días)	100-200 g	1.5 – 2.5 Kg (De 10 a 15 días)	300 - 500 g
Cerdos de Engorda	1.5 Kg (de 8 a 21 días)	300 g	2.0 – 3.0 Kg (De 8 a 10 días)	400 - 600 g
Cerdas reproductoras	1.5 Kg (De 8 a 10 días post- monta)	300 g	2.0 – 2.5 Kg (De 8 a 10 días o 15 - 5* - 15 días)	400 -500 g

*Días sin medicar





Porcinos

BOVINOS.

Como promotor de crecimiento, prevención y tratamiento de Neumonías bacterianas, Fiebre de embarque, Septicemia hemorrágica, Diarreas bacterianas, Pododermatitis.

De manera general se dosifica:

Preventivo: 5 g. por cabeza por día por un periodo entre 7-10 días.

Curativo: 10 g. por cabeza por día por 7 días o más de ser necesario.

En caso de dar concentrado o una dieta racionada por día, se debe calcular el consumo por día del animal, calcular cuantos cabezas se alimentan con una tonelada, multiplicar el número de cabezas por los gramos de ingrediente activo y el resultado multiplicarlo por 5 para obtener cuanto producto terminado se debe agregar por tonelada de alimento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral mezclado con el alimento.

ADVERTENCIAS:

No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

PRESENTACIONES:

Saco con 25 Kg.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

