



Ovinos

Oviver®

Endectocida y Fasciolicida de amplio espectro en solución inyectable.

REG. SAGARPA Q-2083-157

FORMULA:

Cada mL contiene:
Ivermectina.....5.0 mg
Closantel.....125.0 mg
Vehículo, c.b.p. 1.00 mL.

Indicaciones terapéuticas:

Para control parasitario de nemátodos gastrointestinales, pulmonares, *fasciola*, larvas de moscas como *Oestrus ovis*, Hipoderma y parásitos externos como piojos chupadores, garrapatas y ácaros.

DOSIS: Ovinos y caprinos 1 mL por cada 25 kg de peso vivo.

VIA DE ADMINISTRACION:

Subcutánea, en la tabla del cuello o en la axila. OVIVER® puede ser administrado con una jeringa de tipo automática o convencional.

Recomendaciones de manejo:

Corderos: Al mesde edad, y al destete.
Vientres, sementales y reemplazos: Cada 3 o 4 meses según se observen los signos del “gusano de la nariz” o estrosis.

ADVERTENCIAS:

PARA USO EXCLUSIVO EN OVINOS Y CAPRINOS.

No debe usarse éste producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No se administre este producto a Caprinos productores de leche que se destine al consumo humano.

Se han observado algunos casos de animales con signos transitorios después de la administración subcutánea como: una ligera inflamación en el sitio de la inyección y dolor transitorio en ovinos; estas reacciones desaparecen sin necesidad de tratamiento.



Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina por lo cual los recipientes varios y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.

No se debe aplicar por vía intramuscular o intravenosa.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz.

PRESENTACION:

Frascos de plástico de 100 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

