



# Porcinos

## ZIMACAL®

Reg. SAGARPA Q-2083-164

### FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Magnesio	987 mg.
Calcio	795 mg.
Zinc	670 mg.
Vehículo, c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES:

Coadyuvante para la regeneración de la pezuña en casos de gabarro, laminitis, abscesos, úlceras y fisuras plantares.

Coadyuvante para el tratamiento de hipocalcemia, lenta involución uterina y animales débiles post-parto.

Para la prevención y tratamiento de la tetania de los pastos, en potreros con rebrotes verdes luego de lluvias con bajas concentraciones de Magnesio y Zinc.

Tratamiento de desbalances metabólicos por carencias nutricionales de Magnesio y Zinc.

Coadyuvante para reducir el periodo de adaptación en animales que ingresan al corral.

### USO EN:

Bovinos, ovinos y porcinos.

### DOSIS:

**Bovinos, ovinos y porcinos:**

**Terapéutica:** 7 mL por cada 100 Kg de peso.

**Preventiva:** 5 mL por cada 100 Kg de peso.

**Frecuencia de aplicación:**

**Terapéutica:** cada 10 días hasta remisión de los signos y no más de 3 repeticiones, siguiendo con la dosis preventiva.

**Preventiva:** Cada 30 días.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Únicamente subcutánea.



### ADVERTENCIAS:

Con anticipación consulte con el Nutriólogo el aporte total de Zinc, Magnesio y Calcio en la dieta para determinar la dosis y el tiempo a suplementar en forma parenteral.

Tiempo de retiro: 0 días.

Agítese antes de usar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

### PRESENTACIONES:

Frascos con 500 mL.

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

### USO VETERINARIO

