

MULTI-BAC®

FUNGICIDA AGRÍCOLA ORGÁNICO SOLUCIÓN LÍQUIDA "SL"

REGISTRO: RSCO-MEZC-FUNG-0395BSP-X0067-375-0.6

Es un fungicida orgánico. Es una mezcla de esporas de bacterias de *Bacillus subtilis* *Bacillus subtilis* y *Bacillus pumilus* BA53

COMPOSICIÓN %	% EN PESO
BACILLUS SUBTILIS BA32	0.2 %
BACILLUS SUBTILIS BA45	0.2 %
BACILLUS PUMILUS BA53	0.2 %
DILUYENTE	99.4 %

MECANISMO DE ACCIÓN

La acción de las bacterias antagonistas para controlar el desarrollo de patógenos son:

La antibiosis, la competencia por espacio y nutrientes, la interacción directa con los patógenos (microparasitismo y lisis enzimática) y la inducción de resistencia.

Además, las esporas de *Bacillus pumilus* producen fitohormonas que promueven el desarrollo de tejido de raíz, ayudando de esta forma a que la planta exprese su máximo potencial genético.

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	DOSIS (L/ha)	PLAGA	OBSERVACIONES
Jitomate Chile Chile bell Tomate De cáscara Papa Tabaco	S/L	2.0 - 5.0	Marchitez (<i>Fusarium oxysporum</i>)	Realizar aplicaciones al cultivo en intervalos de 7 días. Acortar intervalos de aplicación cuando exista alta población de la plaga.
Pepino Melón Sandía Calabacita Calabaza Chilacayote Chayote				

Nota: Las dosis pueden variar según la zona y el cultivo; por lo anterior, consulte a nuestro Asesor técnico.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección recomendado. Con el equipo de seguridad puesto, abra el envase retirando la tapa e invirtiéndola, colóquela sobre el sello de seguridad y gírela sobre él para abrir con la cejilla de ayuda.

Para medir la cantidad necesaria use un utensilio sólo para este fin, vierta en el tanque o equipo de aplicación con la mitad del volumen recomendado de agua, agite y complete el volumen necesario. No utilice una mezcla de un día para otro. Se recomienda utilizar cuando aparezcan los primeros síntomas. Cuando la presión de enfermedad sea muy alta y/o cuando las condiciones ambientales sean propicias para un rápido desarrollo se recomienda utilizar las dosis mayores.

INCOMPATIBILIDAD

No se debe mezclar multibac con otros productos agroquímicos."



Lapisa SA de CV
(Planta Agrícola)
km 8.5, Carretera La Piedad - Carapan
Cañada de Ramirez, Numanán, Michoacán.
C.P. 59430
01 (352) 690 2001
www.lapisa.com

MULTI-BAC®

Lapisa
AGRÍCOLA
¡Cosechando resultados!

Línea Bio
Campo
M.R.